



## FICHA TÉCNICA

### AquaVac™ Strep Sa

Reg. SAGARPA B-030/2015-001

#### USO ACUÍCOLA

1

#### VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ESTREPTOCOCOSIS CAUSADA POR *Streptococcus agalactiae* EN PECES

##### FÓRMULA:

Cada ml contiene:

*Streptococcus agalactiae*, cepa inactivada TI 513

1.36 x 10<sup>8</sup> células bacterianas

Vehículo c.b.p. (adyuvante oleoso ISA 763A VG)

1 ml

##### DESCRIPCIÓN:

**AquaVac™ Strep Sa** es vacuna inactivada en adyuvante oleoso para la protección contra infecciones causadas por *Streptococcus agalactiae* en Tilapias (*Oreochromis spp.*).

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de especies de peces susceptibles para reducir la mortalidad y las enfermedades derivadas de la estreptococosis provocada por *Streptococcus agalactiae* (Previamente conocida como *Streptococcus difficilis*).

##### ESPECIES DESTINO:

Tilapia (*Oreochromis spp.*).

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyectar intraperitonealmente 0.05 ml en peces de 15 a 40 g de peso. Los peces deben anestesiarse antes de aplicar la inyección. Asegúrese que la aguja penetre a través de la pared del músculo e idealmente sea depositada en la cavidad en donde se localiza la grasa visceral; entre y justo antes de la punta de las aletas pélvicas. Esto es para asegurar que la aguja no penetre órganos internos importantes tales como el hígado, estómago y bazo

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en peces para consumo de 15 a 40 g de peso.

El inicio de la inmunidad fue demostrado a partir de las 3 semanas posteriores a la vacunación a una temperatura del agua de 28° C. La duración de la inmunidad se estableció por lo menos durante 30 semanas después de una sola vacunación.

##### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Se debe utilizar equipo de inyección estéril.
- Se debe dejar a los peces en ayuno durante 24 horas antes de la vacunación.
- Evite que los peces se estresen antes y después de la vacunación.
- Agite la vacuna antes de utilizar.
- Vacune únicamente peces sanos.

##### CONTRAINDICACIONES:

No se conocen.



#### REACCIONES ADVERSAS:

Una pequeña población de los animales tratados puede mostrar lesiones, como adherencias muy leves cerca del sitio de la inyección.

#### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### ***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Al manipular el producto se debe utilizar un equipo de protección personal que incluya un protector de aguja. En caso de inyectarse accidentalmente, consulte inmediatamente a un médico y muéstrelle el prospecto o la etiqueta del empaque.

##### Al usuario:

Este producto contiene aceite. Si usted se inyecta accidentalmente puede sentir dolor severo e inflamación, especialmente si lo hace en una coyuntura o en un dedo en estos casos se debe prestar atención médica inmediata. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, consulte nuevamente a su doctor.

##### Al médico:

Este producto contiene aceite. Una inyección accidental, aunque sea con una cantidad pequeña, puede provocar inflamación intensa y derivar en necrosis isquémica. Se requiere atención quirúrgica INMEDIATA de un especialista y quizá sea necesario realizar una incisión e irrigación del área afectada, especialmente si se trata de la yema o el tendón del dedo.

##### ***Reproducción:***

No se esperan reacciones adversas.

##### ***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No existe información disponible sobre la compatibilidad de esta vacuna con cualquier otra.

##### ***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No se observaron reacciones diferentes a la administración de una sola dosis.

##### ***Incompatibilidades:***

Ninguna conocida.

##### **Precauciones de Almacenamiento:**

Almacenar a una temperatura de entre 2°C a 8° C. No congelar.

Protéjase de la luz.

#### PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

#### PRESENTACIONES:

Frasco de 250 ml (5,000 dosis).

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

**Intervet International B.V.**

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.