

FICHA TÉCNICA

AQUAVAC™ STREP Sa1

Reg. SAGARPA B-030/2015-002

USO ACUÍCOLA

1

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ESTREPTOCOCOSIS CAUSADA POR *Streptococcus agalactiae* EN PECES

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

<i>Streptococcus agalactiae</i> , cepa inactivada TI 1422	1 x 10 ⁹ células bacterianas
<i>Streptococcus agalactiae</i> , cepa inactivada TI 1428	1 x 10 ⁹ células bacterianas
Vehículo c.b.p. (adyuvante oleoso ISA 763A VG)	1 ml

DESCRIPCIÓN:

AquaVac™ Strep Sa1 es una vacuna inactivada en adyuvante oleoso para la protección contra infecciones causadas por *Streptococcus agalactiae* en Tilapias (*Oreochromis spp.*).

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de especies de peces susceptibles para reducir la mortalidad y las enfermedades derivadas de la estreptococosis provocada por *Streptococcus agalactiae* Biotipo 1 (serotipo Ia y III) (Previamente conocida como *Streptococcus difficilis*).

ESPECIES DESTINO:

Tilapia (*Oreochromis spp.*).

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyectar intraperitonealmente 0.05 ml en peces de por lo menos 10g de peso. Los peces deben anesthesiarse antes de aplicar la inyección. Asegúrese que la aguja penetre a través de la pared del músculo e idealmente sea depositada en la cavidad en donde se localiza la grasa visceral; entre y justo antes de la punta de las aletas pélvicas. Esto es para asegurar que la aguja no penetre órganos internos importantes tales como el hígado, estómago y bazo

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en peces para consumo de 10 g de peso.

El inicio de la inmunidad fue demostrado a partir 1 semana posteriores a la vacunación a una temperatura del agua de 28° C. La duración de la inmunidad se estableció por lo menos durante 30 semanas después de una sola vacunación.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Se debe utilizar equipo de inyección estéril.
- Se debe dejar a los peces en ayuno durante 24 horas antes de la vacunación.
- Evite que los peces se estresen antes y después de la vacunación.
- Agite la vacuna antes de utilizar.
- Vacune únicamente peces sanos.

CONTRAINDICACIONES:

No se conocen.

REACCIONES ADVERSAS:

Una pequeña población de los animales tratados puede mostrar lesiones, como adherencias muy leves cerca del sitio de la inyección.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Al manipular el producto se debe utilizar un equipo de protección personal que incluya un protector de aguja. En caso de inyectarse accidentalmente, consulte inmediatamente a un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta del empaque.

Al usuario:

Este producto contiene aceite. Si usted se inyecta accidentalmente puede sentir dolor severo e inflamación, especialmente si lo hace en una coyuntura o en un dedo en estos casos se debe prestar atención médica inmediata. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, consulte nuevamente a su doctor.

Al médico:

Este producto contiene aceite. Una inyección accidental, aunque sea con una cantidad pequeña, puede provocar inflamación intensa y derivar en necrosis isquémica. Se requiere atención quirúrgica INMEDIATA de un especialista y quizá sea necesario realizar una incisión e irrigación del área afectada, especialmente si se trata de la yema o el tendón del dedo.

Reproducción:

No se esperan reacciones adversas.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la compatibilidad de esta vacuna con cualquier otra.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se observaron reacciones diferentes a la administración de una sola dosis.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8° C. No congelar.

Protéjase de la luz.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frasco de 250 ml (5,000 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5830 AA Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.