

## FICHA TÉCNICA

### BREEDERVAC® REO-PLUS

Reg. B-0273-067

#### USO VETERINARIO



1

#### VACUNA INACTIVADA EN VEHÍCULO OLEOSO PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA LA INFECCIÓN DE LA BOLSA DE FABRICIO Y LA REOVIROSIS AVIAR

#### FÓRMULA:

Cada porción contiene:

Virus IBF, cepa estándar D-78	20%
Virus IBF, cepa variante A (1084A)	19%
Virus IBF, cepa variante GLS-5	20%
Virus IBF, cepa variante E	1%
Reovirus, cepa 1733	20%
Reovirus, cepa 2408	20%
Vehículo c.b.p.	1 porción.

#### DESCRIPCIÓN:

**BREEDERVAC® REO-PLUS** es una vacuna bivalente inactivada contiene una cepa estándar y las variantes Delaware A, E (100% derivada de la bolsa de Fabricio) y GLS-5 de la enfermedad de Gumboro y las cepas 1733 y 2408 del virus de la reovirus aviar. Estos virus han sido inactivados y suspendidos en la fase acuosa de una emulsión oleosa.

#### INDICACIONES:

Para la inmunización de aves de reemplazo, reproductoras y progenitoras sanas, para la prevención de la enfermedad de Gumboro y de la reovirus aviar.

#### ESPECIES DESTINO:

Aves (reproductoras de reemplazo).

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello en aves no menores de 3 semanas de edad o intramuscular en la pechuga, empleando una jeringa estéril y una aguja de calibre 18 mm de ½ pulgada de largo.

#### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Aunque esta vacuna se puede usar para vacunación primaria desde las 3 semanas de edad o mayores, la evidencia disponible sugiere que la mejor protección se obtiene cuando se usa para vacunar aves previamente inmunizadas con vacuna a virus vivo del mismo tipo. No administre esta vacuna durante el periodo crítico de las gallinas de postura, desde el inicio hasta después de la producción máxima de huevos.

**Ejemplos, Aves reproductoras:**

Vacunación primaria con la vacuna a virus vivo modificado atenuado del Reovirus Aviar antes de las 12 semanas de vida.

Vacunación primaria a virus vivo contra la Enfermedad de Gumboro, antes de las 8 semanas de edad.

La vacunación con **BREEDERVAC® REO PLUS** se debe realizar entre las 9 y 20 semanas de edad, después de las vacunaciones primarias. Se debe esperar un periodo mínimo de 4 semanas entre la última vacunación con virus vivo y la aplicación de BREEDERVAC® REO PLUS. Deben tomarse en cuenta las condiciones locales y consultar al Médico Veterinario responsable.

2

**CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

- Asegúrese que el equipo de vacunación esté limpio y estéril antes de usarlo.
- Evite su contaminación.
- Las aves destinadas para consumo humano deberán vacunarse exclusivamente por vía subcutánea.
- La inyección de la vacuna en el músculo de la pechuga puede crear problemas en las plantas procesadoras bajo ciertas condiciones.

**CONTRAINDICACIONES:**

No administre esta vacuna a las aves durante el periodo crítico de postura, desde el comienzo hasta la producción máxima de huevos.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Puede producirse una reacción local en el sitio de la inyección.

**ADVERTENCIAS:**

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

La inyección accidental de esta vacuna en humanos puede causar reacciones locales por lo que se debe recurrir a un Médico inmediatamente.

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Fertilidad y puesta:***

No administre esta vacuna a las aves durante el periodo crítico de postura.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No utilice equipo de vacunación con piezas de goma, ya que la emulsión oleosa podría afectar ciertos tipos de goma.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

Ninguna diferente a los de dosis única.

***Incompatibilidades:***

No mezclar con ningún otro producto de uso veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 a 8°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

Una vez abierto el empaque utilice todo el contenido del frasco.

**PERIODO DE RETIRO:**

No vacunar durante los 42 días previos al sacrificio de las aves.

**PRESENTACIONES:**

Frasco con 500 ml (1000 dosis).

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

3

**INFORMACIÓN ADICIONAL:  
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:  
**Intervet Inc.**  
29160 Intervet Lane,  
P.O. Box 318, Millsboro,  
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.