

## FICHA TÉCNICA

### CIRCUMVENT™ PCV

Reg. SAGARPA B-0273-198

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA CONTRA EL CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2

##### FÓRMULA:

Cada 2 ml contiene:

Antígeno de circovirus tipo 2

Vehículo c.b.p.

≥ 1.2 R.P. \*

2 ml

Contiene adyuvante Microsol/Diluvac Forte para estimular una respuesta inmune sólida.

\*R.P.= Potencia Relativa

##### DESCRIPCIÓN:

**CIRCUMVENT™ PCV** contiene un antígeno inactivado por medio de un sistema vector de baculovirus, el cual expresa el producto génico ORF2 del circovirus porcino tipo 2.

##### INDICACIONES:

Vacuna subunitaria inactivada lista para usarse como ayuda en la prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus, causada por el circovirus porcino tipo 2. Contiene el adyuvante Microsol Diluvac Forte® para una óptima respuesta inmune.

##### ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión Inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar 2 ml por cerdo vía intramuscular a partir de la tercera semana de edad. Revacunar 3 semanas después con una dosis igual. El pie de cría debe ser vacunado cada 6 meses.

##### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25 °C).
- Agítese antes de usar.

##### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.



#### REACCIONES ADVERSAS:

Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 días después de la vacunación. Algunos lechones quizás pueden deprimirse y pueden mostrar un consumo de alimento reducido por unos días.

#### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.  
Una vez abierto el frasco, utilice todo el contenido.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:*

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

##### *Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:*

No se dispone de información sobre el efecto del uso concomitante a esta vacuna con cualquier otro producto, excepto para M+PAC<sup>®</sup>.

Circumvent<sup>™</sup> PCV se puede utilizar simultáneamente con M+PAC<sup>®</sup> en cerdos de 3 semanas de edad.

##### *Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

Si ocurriera una reacción anafiláctica, el antídoto es epinefrina.

##### *Incompatibilidades:*

No se reconocen incompatibilidades.

No se recomienda mezclar con otros medicamentos.

##### *Precauciones de Almacenamiento:*

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

#### PERIODO DE RETIRO:

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

#### PRESENTACIONES:

Frasco con 100 ml (50 dosis).

Frasco con 200 ml (100 dosis).

Frasco con 500 ml (250 dosis).

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

**Intervet Inc.**

29160 Intervet Lane,  
P.O. Box 318, Millsboro,  
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.