



FICHA TÉCNICA

EQUILIS® PREQUENZA TE

Reg. SAGARPA B-0273-256

USO VETERINARIO

1

VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN ACTIVA DE CABALLOS Y PONIES CONTRA EL TÉTANOS E INFLUENZA EQUINA

FÓRMULA:

Cada dosis de 1 ml contiene	
A/equine-2/South Africa/4/03	50 AU ¹
A/equine-2/Newmarket/2/93	50 AU ¹
Toxoide tetánico	40 Lf ²
Saponina purificada (Adyuvante)	375 µg
Vehículo c.b.p.	1 ml

¹Unidades de antígeno

²Corresponde a ≥ 30 UI/ml

DESCRIPCIÓN:

Equilis® Te contiene subunidades hemaglutinina/neuraminidasa purificadas de los virus de la Influenza Equina A/equine-2/South Africa/4/03 H3N8 (subtipo Americano, Florida sublinaje clade 1) y A/equine2/Newmarket/2/93 H3N8 (subtipo Europeo) y toxoide tetánico en suspensión.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de caballos contra la influenza equina, para reducir la gravedad y duración de los síntomas clínicos y la excreción de virus tras la infección, así como la inmunización activa contra tétanos para evitar la mortalidad.

ESPECIES DESTINO:

Equinos (Caballos y ponies).

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía intramuscular profunda.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

(Ver esquema más abajo).

Influenza:


Programa de vacunación primaria: A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas entre sí. El programa de vacunación primaria da lugar a inmunidad frente a la influenza equina que se mantiene durante por lo menos 5 meses. Los potros deben ser vacunados de los 6 meses de edad en adelante. Si se vacuna al animal antes de los 6 meses de edad, habrá protección completa a partir de la tercera dosis (primera revacunación).



Revacunación: La primera revacunación (tercera dosis) se administra 5 meses después del programa de vacunación primario. Esta revacunación con Equilis Prequenza Te da lugar a inmunidad frente a la influenza equina que se mantiene durante al menos 12 meses. La segunda revacunación se administra 12 meses después de la primera revacunación. Para mantener los niveles de inmunidad para el componente influenza, se recomienda el uso alterno, a intervalos de 12 meses, de una vacuna adecuada frente a la influenza equina que contenga las cepas A/equine-2/South Africa/4/03 y A/equine-2/Newmarket/2/93.

Tétanos:

Programa de vacunación primaria: A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas entre sí. El programa de vacunación primaria da lugar a la inmunidad frente al tétanos durante al menos 17 meses.



En caso de aumento de riesgo de infección o de ingestión insuficiente de calostro, puede administrarse una inyección adicional a los 4 meses de edad, seguido del programa de vacunación completo.

Duración de la inmunidad:

Influenza:

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación básica.
 Duración de la inmunidad: 5 meses después de la vacunación básica.
 12 meses después de la primera revacunación.

Tétanos:

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria.
 Duración de la inmunidad: 17 meses después de la vacunación primaria.
 24 meses después de la primera revacunación.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos.
- Utilice material estéril para la administración.
- Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente 15-25 °C.

CONTRAINDICACIONES:

No vacunar animales enfermos.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producirse una hinchazón difusa en el lugar de la inyección, esta hinchazón es temporal y se revierte en 2 días. En algunos casos fiebre acompañada de letargo e inapetencia.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.



Si por accidente, la persona que administra la vacuna se inyectará a sí misma, se recomienda que se notifique inmediatamente a un médico, y se pueste el folleto del empaque o la etiqueta del producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Se puede administrar en el periodo de gestación y lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Se ha demostrado que el uso concurrente con suero tetánico de MSD Salud Animal es seguro y eficaz. Se recomienda no administrar otras vacunas en un periodo corto, ya sea antes o después de la vacunación con el presente producto.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Después de la administración con dosis doble, no se han observado efectos secundarios diferentes a aquellos descritos, con excepción de una leve depresión durante el día de la vacunación.

Incompatibilidades:

No se conoce ninguna, sin embargo, la vacuna no deberá mezclarse con otra vacuna u otro producto inmunológico.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C.

No congelar. Mantener en la oscuridad

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con 10 frascos de una dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx