

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® COR4+IB+ND+EDS

Reg. B-0273-190

USO VETERINARIO



1

VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORIZA INFECCIOSA, BRONQUITIS INFECCIOSA, LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y EL SÍNDROME DE BAJA POSTURA EN LAS AVES.

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Avibacterium paragallinarum (antes *Haemophilus*):

Serotipo A cepa 083

≥ 1 CPD₇₀*

Serotipo B cepa Spross

≥ 1 CPD₇₀*

Serotipo C cepa H-18

≥ 1 CPD₇₀*

Serotipo variante tipo B cepa 48

≥ 1 CPD₇₀*

Virus de Bronquitis Infecciosa M41

≥ 2.0 log₂ unidades HI

Virus de la EDS 76 cepa BC14

≥ 3.2 log₂ unidades HI

Virus de la Enfermedad de Newcastle cepa Clone 30

≥ 4.0 log₂ unidades HI/50° de una dosis
conteniendo ≥50 unidades PD₅₀

1 dosis

Vehículo c.b.p.

*Dosis protectora del 70% de las aves.

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® COR4+IB+ND+EDS contiene cepas inactivadas de *Avibacterium paragallinarum* (*Haemophilus paragallinarum*) serotipo A, B, C, y tipo B variante, contra la coriza infecciosa, el virus de la Bronquitis infecciosa, el virus de la enfermedad de Newcastle y el síndrome de baja postura. Las cepas se incorporan en emulsión de agua en aceite lo cual provee una prolongada estimulación de la inmunidad.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa y para reducir la infección y los signos clínicos causados por la Coriza infecciosa, para proteger contra infecciones causadas por el virus de la Bronquitis infecciosa, la enfermedad de Newcastle y el síndrome de baja postura.

ESPECIES DESTINO:

Aves de reemplazo de postura comercial y reproductoras

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml de la vacuna por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunar aves de 14 semanas de edad en adelante y no durante las 4 semanas antes del inicio de la postura. Para conseguir una protección máxima contra la coriza aviar, las aves se deben vacunar con Nobilis Corvac 4 al menos 6 semanas antes de la vacunación con Nobilis Cor4+IB+ND+EDS. Para conseguir un efecto de refuerzo óptimo contra la bronquitis infecciosa y la Enfermedad de Newcastle, las aves se deben inmunizar con vacunas de virus activo al menos 4 semanas antes de la vacunación con Nobilis Cor4+IB+ND+EDS. No es necesaria la primovacuna para el Síndrome de Baja Postura.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de administrar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- Agite bien antes de usar.
- No usar menos de una dosis por ave.
- Evite su contaminación.

2

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:

Las aves pueden mostrarse menos activas un día después de la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al día siguiente. Se puede observar una pequeña inflamación transitoria en el lugar de la inyección en la mayoría de las aves durante las cuatro semanas posteriores a la vacunación la cual desaparece gradualmente.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Fertilidad y puesta:

No vacunar dentro de las 4 semanas previas al inicio de la postura.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No mezclar con otras vacunas. Esta vacuna contiene antígenos inactivados, no deben esperarse interacciones cuando se aplica conjuntamente con otras vacunas.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se han observado otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis, que las ya observadas después de la vacunación con una sola dosis.

Incompatibilidades:

Ninguna conocida.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

Una vez abierto el envase, utilice el contenido durante las 3 horas subsecuentes.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 1,000 dosis (500 ml).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.