

## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS® CORVAC-4

Reg. B-0273-167

#### USO VETERINARIO



1

#### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORIZA INFECCIOSA CAUSADA POR *Avibacterium paragallinarum*

##### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

*Avibacterium paragallinarum* (antes *Haemophilus*):

$\geq 3.0 \log_{10} \text{TCID}_{50}$

Serotipo A cepa 083

$\geq 1 \text{CPD}_{70}^*$

Serotipo B cepa Spross

$\geq 1 \text{CPD}_{70}^*$

Serotipo C cepa H-18

$\geq 1 \text{CPD}_{70}^*$

Serotipo variante tipo B cepa 48

$\geq 1 \text{CPD}_{70}^*$

Vehículo c.b.p.

1 dosis

\*Dosis protectora del 70% de las aves.

##### DESCRIPCIÓN:

**NOBILIS® CORVAC-4** vacuna de células completas, contiene cepas inactivadas de *Avibacterium paragallinarum* (antes *Haemophilus*) serotipos A, B, C, y una tipo B variante, las cuales estimulan la inmunidad específica contra la Coriza Infecciosa Aviar. Las cepas se incorporan en emulsión de agua en aceite lo cual provee una prolongada estimulación de la inmunidad.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de aves, para reducir la infección y los signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*.

##### ESPECIES DESTINO:

Aves de reemplazo de postura comercial y reproductoras.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.5 ml por vía intramuscular o subcutánea en aves no menores de 3 semanas de edad empleando una aguja de calibre 18 mm de  $\frac{1}{2}$  ó  $\frac{1}{4}$  pulgada de largo.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunar aves de tres semanas de edad en adelante y repetir la vacunación antes del inicio del periodo de postura. El intervalo mínimo entre las vacunaciones deber ser de 6 semanas.

##### CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de administrar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18-25°C).
- Agite bien antes de usar.
- No usar menos de una dosis por ave.
- Evite su contaminación.

##### CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Las aves pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al día siguiente. Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el sitio de inyección una pequeña inflamación pasajera que desaparece gradualmente.

#### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

##### *Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:*

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

##### *Fertilidad y puesta:*

No vacunar durante el período de postura.

##### *Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:*

**NOBILIS® CORVAC-4** puede ser incluida en un programa de vacunación de las aves, que consiste en la vacunación con **NOBILIS® IB+ND+EDS** y **NOBILIS® IB+ND**.

##### *Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):*

No se han observado otras reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con una sobredosis, que las ya observadas después de la vacunación con una sola dosis.

##### *Incompatibilidades:*

Ninguna conocida.

##### *Precauciones de Almacenamiento:*

Conservar entre 2 a 8°C.

Una vez abierto el envase, utilice el contenido durante las 3 horas subsecuentes.

No congelar.

#### PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

#### PRESENTACIONES:

Caja con 12 frascos con 1,000 dosis.

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

##### ELABORADO POR:

**Intervet International B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

##### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.