

FICHA TÉCNICA

NOBILIS® Ma5 + CLONE 30

Reg. B-0273-063

USO VETERINARIO



1

VACUNA BIVALENTE COMO AYUDA EN LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Virus vivo de la Bronquitis Infecciosa serotipo Massachussets, cepa Ma5	≥ 3.0 log ₁₀ DIE ₅₀
Virus vivo de la Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30	≥ 6.0 log ₁₀ DIE ₅₀
Vehículo c.b.p.	1 dosis

DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® Ma5+ Clone 30 vacuna bivalente liofilizada a virus activo que contiene la cepa La Sota (Clone 30) del virus de la enfermedad de Newcastle y la cepa Ma5 (serotipo Massachussets) del virus de la Bronquitis Infecciosa aviar.

INDICACIONES:

Para la inmunización de aves sanas contra la Bronquitis Infecciosa Aviar y la Enfermedad de Newcastle.

ESPECIES DESTINO:

Aves (pollo de engorda, reproductoras y gallina de postura).

FORMA FARMACÉUTICA:

Esferas liofilizadas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para aves de un día de edad o mayores administrar por aspersión y en aves de dos semanas de edad o mayores por vía intranasal, ocular u oral en el agua de bebida.

Preparación de la vacuna:

NO ABRA NI MEZCLE LA VACUNA HASTA ESTAR LISTO PARA COMENZAR LA VACUNACIÓN. USE LA VACUNA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERLA RECONSTITUIDO.

1. Quite el sello y el tapón del frasco que contiene la vacuna.
2. Vierta agua fría y limpia (que no haya sido tratada con desinfectantes en los frascos de vacunas hasta llenar dos terceras partes de los mismos).
3. Tape el frasco con los tapones de hule y agítelo hasta que se disuelva la pastilla liofilizada.
4. Par la aplicación por aspersión o agua de bebida, vierta la vacuna rehidratada en los recipientes adecuados.

Aspersión con gota gruesa

1. Prepare la vacuna como se indica en el punto anterior. Para la vacunación con gota gruesa siga las recomendaciones del fabricante de la aspersora en lo concerniente a la cantidad de agua a emplear según sus especificaciones. Por ejemplo, una máquina que administra 10 ml por caja de 100 pollos, el volumen total para 10,000 dosis es de 1000 ml. Mezclar completamente, use solamente agua fría destilada.
2. Agregar la solución con la vacuna al depósito de la aspersora. No use ningún desinfectante, detergente o leche descremada.
3. En el caso de pollos de 1 día de edad, coloque las cajas conteniendo 100 pollos c/u en la banda transportadora o en la aspersora o

- en el caso de aves mayores aspérgelas caminando a través de la caseta.
4. En granjas, al vacunar por aspersión cierre las cortinas y apague todos los ventiladores; al finalizar la vacunación enciéndalos nuevamente y abra las cortinas. Tenga cuidado en tiempo de calor. Los trabajadores que lleven a cabo la aspersión deberán usar mascarilla para proteger el rostro.

Administración por agua de bebida.

1. No use desinfectantes de ninguna clase en el agua de bebida durante las 48 horas previas a la vacunación y durante las 24 horas posteriores.
2. Se aconseja privar de agua a los animales durante algún tiempo (dependiendo de las condiciones climáticas y edad de las aves) con el objeto de que tengan sed en el momento de aplicar la vacuna.
3. Lave y enjuague bien los bebederos con agua fría y limpia. No use desinfectantes ni detergentes para lavarlos.
4. Mezcle la vacuna rehidratada con agua fría y limpia de acuerdo a la tabla siguiente:

Edad de las aves (semanas)	Agua por cada 1000 dosis de vacuna
2 a 4	Hasta 9.5 litros
4 a 8	Hasta 19 litros
8 o mayores	Hasta 38 litros

Con el objeto de proteger el virus vacunal, se pueden agregar 100 gr de leche descremada en polvo por cada 38 litros de agua. Mezcle la leche antes de agregar la vacuna previamente hidratada.

5. Distribuya la solución en los bebederos de las aves. No exponga los bebederos a los rayos del sol. No administre más agua hasta que no se haya consumido la totalidad de la vacuna.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Depende de la prevalencia de las enfermedades de Newcastle y Bronquitis Infecciosa en la zona, granja o parvada. Aplicar por aspersión con gota gruesa o en agua de bebida a partir de la primera semana de edad.

CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- No diluya ni aumente la dosis.
- Vacune todas las aves susceptibles en un mismo local en un solo manejo.

CONTRAINDICACIONES:

No vacune aves enfermas o estresadas.

REACCIONES ADVERSAS:

La vacunación puede inducir una reacción respiratoria transitoria leve que dura unos días, que puede depender de la salud y el estado de las aves.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto. Evite el contacto con los ojos. El virus de Newcastle puede causar conjuntivitis en humanos.

Fertilidad y puesta:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso conjunto de esta vacuna con cualquier otra. No administrar dentro de los 14 días antes o después de la administración de cualquier otra vacuna que tiene el tracto respiratorio como órgano blanco.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Tras la administración de una sobredosis no se presentaron síntomas distintos a los ya mencionados en reacciones adversas.

Incompatibilidades:

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Charola con 12 contenedores de aluminio con 1,000 dosis cada uno.

Charola con 12 contenedores de aluminio con 2,500 dosis cada uno.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.