

## FICHA TÉCNICA

### NOBILIS® REO 2177

Reg. B-0273-170

#### USO VETERINARIO



1

#### VACUNA PARA LA INMUNIZACIÓN DE AVES CONTRA LA ARTRITIS VIRAL O TENOSINOVITIS AVIAR

##### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Reovirus Aviar activo vepa 2177

Vehículo c.b.p.

$\geq 3.1 \log_{10} \text{TCID}_{50}$

1 dosis

##### DESCRIPCIÓN:

NOBILIS® REO 2177 es una vacuna liofilizada que contiene Reovirus aviar cepa 2177, no patogénica.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de pollos sanos para reducir Tenosinovitis y síntomas asociados a la enfermedad debidos a la infección por Reovirus. La vacuna puede administrarse desde 1 día de edad y es eficaz en la presencia de anticuerpos maternos. La vacuna es eficaz para sensibilizar a vacunas inactivadas de Reovirus.

##### ESPECIES DESTINO:

Aves (Pollo de engorda, y pollas de reemplazo de reproductoras).

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.2 ml por ave, por vía intramuscular (músculos del muslo o pechuga; o subcutánea en la base del cuello).

##### *Preparación de la vacuna:*

Reconstituir el liofilizado en el diluyente para vacunas de la enfermedad de Marek.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en pollo de engorda y de reemplazo sanos de un día de edad, en aves de reemplazo de progenitores y reproductores, es necesario revacunar a las 10 o 12 semanas con virus inactivados.

##### CONSEJOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Evite su contaminación.
- Agite antes de usar.

##### CONTRAINDICACIONES:

No aplicar vía in-ovo.

**REACCIONES ADVERSAS:**

No se han observado efectos adversos sistémicos o locales después de la vacunación.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente aves sanas.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Fertilidad y puesta:***

No administrar durante el periodo de postura.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Puede ser administrada simultáneamente con la vacuna contra la enfermedad de Marek de Intervet en aves de 1 día de edad.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

No se observan síntomas tras la administración de una sobredosis de la vacuna.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario (excepto el diluyente suministrado para su uso con el producto).

***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar entre 2 a 8°C.

No congelar, ni exponer a la luz solar.

Una vez abierto el envase, utilice todo el contenido.

**PERIODO DE RETIRO:**

Cero días.

**PRESENTACIONES:**

Caja con 10 frascos con 10,000 dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**ELABORADO POR:**

**Intervet International, B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.