



## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® DH PARVO C

Reg. SAGARPA B-0273-058

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA LIOFILIZADA A VIRUS ACTIVO ATENUADO PARA LA PREVENCIÓN DEL DISTEMPER, LA HEPATITIS Y LA PARVOVIROSIS CANINA

##### FÓRMULA:

Cada frasco de 1 ml con la pastilla liofilizada contiene:

Virus vivo atenuado de Distemper canino (moquillo canino), cepa Onderstepoort	$\geq 10^{3.0}$ DICT <sub>50</sub>
Virus vivo atenuado de Adenovirus canino tipo 2, cepa Manhattan, LPV3	$\geq 10^{3.0}$ DICT <sub>50</sub>
Virus vivo atenuado de Parvovirus canino, cepa 154	$\geq 10^{7.0}$ DICT <sub>50</sub>
Vehículo c.b.p.	1 ml



##### DESCRIPCIÓN:

**Nobivac® DH Parvo C** es una vacuna liofilizada, contiene virus vivo atenuado del Distemper Canino (moquillo, cepa Onderstepoort), Adenovirus Canino Tipo 2 (cepa CAV2 Manhattan LPV3) y Parvovirus Canino cepa 154, cultivados en líneas celulares, de bajo pasaje y alta masa antigénica. Contiene estabilizadores y trazas de antibióticos.

##### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de perros sanos contra el distemper canino (moquillo), hepatitis contagiosa producida por el Adenovirus Canino Tipo 1 (CAV1) e infecciones causadas por Adenovirus Canino Tipo 2 (CAV2) y para la Parvovirus Canina (CPV) (2, 2ª, 2b, 2c).

##### ESPECIES DESTINO:

Caninos.

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía subcutánea.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Para la vacunación contra la Hepatitis (CAV1) y la infección por CAV2 es de las 8 a 12 semanas preferentemente, ya que probablemente esta es la edad más precoz en la que los Anticuerpos Derivados de la Madre (MAD por sus siglas en inglés) residuales contra estas enfermedades habrán disminuido a niveles que probablemente no interferirán en la respuesta inmune. Para la vacunación contra el Distemper y el Parvovirus canino la edad preferida es entre las 6 y 9 semanas de edad, pero sería aconsejable realizar la vacunación final contra estas enfermedades a las 12 semanas de vida, con el objeto de asegurar la protección de los cachorros con niveles muy elevados de anticuerpos derivados de la madre. Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac® DH Parvo C forme parte de las pautas de vacunación más amplia:

A. Pauta para cachorros en los que se inició la vacunación a las 8 a 9 semanas de vida:

8-9 semanas de vida	Nobivac® DH Parvo C con Nobivac® L.
12 semanas de vida	Nobivac® DH Parvo C con Nobivac® L y Nobivac® Rabia o Nobivac® RL.



B. Pauta Para cachorros en los que la vacunación no se inició antes de las 12 semanas de vida:

12 semanas de vida Nobivac® DH Parvo C con Nobivac® L y Nobivac® Rabia o Nobivac® RL.

14-15 semanas de vida Nobivac® L.

**REVACUNACIÓN:**

Se recomienda que los perros se vacunen contra:

- 1) Distemper canino, hepatitis canina y parvovirus: hasta cada tres años.
- 2) Rabia: hasta cada 3 años (de acuerdo con la regulación local).

**Preparación de la vacuna:**

Reconstituir el liofilizado de Nobivac® DH Parvo C con la adición de un vial (1ml) de Nobivac® diluyente estéril o un vial (1ml) de alguno de los siguientes productos Nobivac®: Nobivac® L (vacuna de leptospirosis canina), Nobivac® Rabia o Nobivac® RL.

La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración.

Evitar la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Ocasionalmente puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son auto limitadas en la mayoría de los casos.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos.

Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

**Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:**

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

Se pueden vacunar hembras gestantes.

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

Cuando la inmunización es una parte de un programa integral, Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia y/o Nobivac® RL se pueden utilizar para reconstituir el liofilizado Nobivac® DH Parvo C.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario, excepto los productos antes mencionados. La decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se deberá revisar caso por caso.

**Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):**

No hay signos particulares al aplicar 10 veces la dosis indicada.

**Incompatibilidades:**

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario excepto Nobivac® diluyente o la vacuna de la serie Nobivac® mencionados en la sección de interacciones.



***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C.

No congelar. Mantener en la oscuridad

Nobivac® Diluyente puede conservarse a temperatura ambiente.

Evitar la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez fuera del refrigerador antes de usar.

La potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor.

3

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRESENTACIONES:**

Caja con 10 frascos de una dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:

**Intervet International, B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)