

## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® FELINE 2-FeLV

Reg. SAGARPA B-0273-270

#### USO VETERINARIO



1

### VACUNA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEUCEMIA VIRAL FELINA

#### FÓRMULA:

Cada dosis (1ml) contiene:

Virus inactivo de Leucemia Felina, aislamiento Rickard

\*Unidad de referencia medida por la prueba de ELISA para gp70

≥ 1.0 UR\*

Conservadores:

Gentamicina y Anfotericina B

#### DESCRIPCIÓN:

La primer vacuna con una duración probada de inmunidad de dos años para prevenir la viremia persistente de la leucemia felina.

#### INDICACIONES:

Para la inmunización de gatos sanos de más de 9 semanas contra el virus de Leucemia Felina. La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de Leucemia Felina.

Inicio de la inmunidad:

Duración de la inmunidad: 2 años

#### ESPECIES DESTINO:

Gato



#### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable de color rosa

La vacuna ha sido inactivado químicamente y combinado con un adyuvante diseñado para mejorar la respuesta inmunitaria

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea



Administrar el contenido (1 mL) por vía subcutánea

### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Primovacunación: Se requieren dos dosis para la inmunización primaria con un intervalo de 3-4 semanas entre cada una. Inyectar la primer dosis (1 ml) por vía SC a 9 semanas de edad o posterior.

Revacunación: Cada dos años con una dosis única de Nobivac® Feline 2-FeLV. Los estudios indican que los gatos vacunados con Nobivac® Feline 2-FeLV están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración.

Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

Permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de administrarla

Se recomienda una aguja de calibre 22

Se recomienda realizar pruebas de diagnóstico de todos los gatos para el antígeno FeLV antes de la vacunación.

### CONTRAINDICACIONES:

Ver Precauciones especiales. Gestación, Lactancia y Reproducción

### REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxia y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad. Si se produce tal reacción, debe de administrarse sin demora epinefrina, corticosteroides y/o antihistamínicos dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Algunos reportes sugieren que, en gatos, la administración de ciertos biológicos veterinarios puede inducir el desarrollo de sarcomas en el sitio de inyección.

### ADVERTENCIAS:

Vacunar únicamente animales sanos

### PRECAUCIONES ESPECIALES:

#### Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

#### Gestación, lactancia y fertilidad:

No utilizar durante la gestación y lactancia, puesto que el medicamento veterinario no ha sido investigado en gatas gestantes o en lactación.

#### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida

#### Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentaron signos diferentes a los mencionados en reacciones adversas



**Incompatibilidades:**

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario

**Precauciones de Almacenamiento:**

Conservar en refrigeración de 2 y 8°C, protegido de la luz.

No congelar.

3

**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



[farmacovet@merck.com](mailto:farmacovet@merck.com)

**ELABORADO POR:**

**Intervet Inc.**

Omaha, Nebraska 68103

USA

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.

[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)