



## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® KC

Reg. SAGARPA B-0273-119

#### USO VETERINARIO

1

### VACUNA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA (TOS DE LAS PERRERAS)

#### FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

*Bordetella bronchiseptica*, cepa B-C2

≥ 10<sup>8.3</sup>

Virus de la Parainfluenza canina, cepa Cornell

≥ 10<sup>3.8</sup> TCDI<sub>50</sub>

Vehículo c.b.p.

1 dosis

#### DESCRIPCIÓN:

**Nobivac® KC** es una vacuna modificada de aplicación intranasal que contiene el virus atenuado de la parainfluenza canina, cepa Cornell y un cultivo avirulento de *Bordetella bronchiseptica*, cepa B-C2. Se presenta en forma liofilizada con diluyente estéril para su reconstitución.

#### INDICACIONES:

Para la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras"), causada por un agente viral parainfluenza canina y por un agente bacteriano *Bordetella bronchiseptica*, en cachorros y perros adultos sanos.

#### ESPECIES DESTINO:

Caninos.

#### FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 0.4 ml por vía intranasal.

#### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administrar en cachorros sanos, a partir de las tres semanas de edad, en los perros adultos, deben ser vacunados por lo menos 72 horas antes del confinamiento o cuando pudiera existir el riesgo de infección por traqueobronquitis infecciosa canina. Revacunar anualmente.

*Preparación de la vacuna:*

Reconstituya en forma aséptica la vacuna con el diluyente adjunto. Retire la aguja y administre 0.4 ml en un orificio nasal.

La vacunación con **Nobivac KC®** estimula una respuesta inmune local y rápida en el tracto respiratorio, por lo tanto, inhibe la infección en el sitio de entrada y previene la aparición de signos clínicos. La protección contra *Bordetella bronchiseptica* después de la vacunación ocurre a las 72 horas post-vacunación. Además de la respuesta inmune local, también estimula una inmunidad sistémica dentro de las tres semanas posteriores a su aplicación intranasal. El pequeño volumen para administrar (0.4 ml), así como la vía de administración intranasal, permiten una fácil aplicación especialmente en los cachorros jóvenes de razas pequeñas.



**CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:**

- Sólo deberán vacunarse animales sanos.
- Utilice material estéril para la administración.
- No deben utilizarse jeringas o agujas esterilizadas químicamente para la aplicación de la vacuna.
- Agite bien antes de usar.
- Utilice el contenido dentro de la primera hora después de su reconstitución.

**CONTRAINDICACIONES:**

Ninguna.

**REACCIONES ADVERSAS:**

No se presentaron reacciones post-vacúnales en el 99.7% de los animales tratados.  
En caso de reacción anafiláctica, se sugiere administrar epinefrina.

**ADVERTENCIAS:**

Vacune únicamente animales sanos. Los animales que incuban alguna enfermedad, o animales bajo condiciones de estrés debido al transporte, malnutrición o parasitosis podrían no presentar ni mantener una inmunidad adecuada.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**PRECAUCIONES ESPECIALES:**

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Gestación, lactancia y fertilidad:***

Se pueden vacunar hembras gestantes.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

No administrar en conjunto con otros tratamientos intranasales o durante el tratamiento con antibióticos.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

Ninguna.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Conservar en refrigeración de 2°C a 7°C.

No congelar.

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**PRESENTACIONES:**

Caja con 5 frascos de una dosis, más diluyente.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.



**INFORMACIÓN ADICIONAL:**  
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.  
**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

ELABORADO POR:  
**Intervet Inc.**  
405 State Street  
Millsboro, Delaware 19966  
USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**Intervet México, S.A. de C.V.**  
Av. San Jerónimo 369, Colonia  
La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.