

## FICHA TÉCNICA

### NOBIVAC® TRICAT TRIO

Reg. SAGARPA B-0273-267

#### USO VETERINARIO

1

#### VACUNA CONTRA CALICIVIRUS FELINO, RINOTRAQUEÍTIS VIRAL FELINA Y PANLEUCOPENIA FELINA



#### FÓRMULA:

Cada dosis (1ml) de vacuna reconstituida contiene:

Virus atenuado de Calicivirus felino, cepa F9

≥ 4.6 log<sub>10</sub> PFU\*

Virus atenuado de Rinotraqueítis felina, cepa G2620A

≥ 5.2 log<sub>10</sub> PFU\*

Virus atenuado de Panleucopenia felina, cepa MW-1

≥ 4.3 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>\*\*

\*Unidades de formación de placas

\*\*Dosis infecciosa en cultivo celular 50%

#### DESCRIPCIÓN:

Vacuna para la protección de los gatos contra enfermedades esenciales: Calicivirus, Rinotraqueítis infecciosa y Panleucopenia

#### INDICACIONES:

Para la inmunización activa de gatos, a partir de las 8 semanas de edad para reducir los signos clínicos y la excreción vírica provocados por la infección con Calicivirus felino (FCV) y con el Herpesvirus felino tipo 1 (FHV-1) / Rinotraqueítis felina y para prevenir los signos clínicos, la excreción vírica y la leucopenia causada por el virus de la Panleucopenia felina (FPLV).

Inicio de la inmunidad: 4 semanas FCV y FHV-1  
3 semanas FPLV

Duración de la inmunidad: 1 año FCV y FHV-1  
3 años FPLV

#### ESPECIES DESTINO:

Gato



#### FORMA FARMACÉUTICA:

Liofilizado: Pastilla de color blanquecino.

Disolvente: Solución clara incolora

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea



Administrar 1 ml de vacuna reconstituida por vía subcutánea

Aspecto visual del medicamento veterinario reconstituido : suspensión de color rosáceo o rosa.

2

## PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Primovacunación. se deben realizar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 3-4 semanas entre cada una. La primera administración a la edad de 8 a 9 semanas y la segunda administración a la edad de 12 semanas.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual.

## CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Sólo deberán vacunarse animales sanos y deberá realizarse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación.

Utilice material estéril para la administración.

Evite la contaminación de la vacuna con restos de desinfectantes o alcohol.

Reconstituir la vacuna con el diluyente suministrado en el mismo empaque (Nobivac® diluyente) y permitir que alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de administrarla

## CONTRAINDICACIONES:

Ver Precauciones especiales. Gestación, Lactancia y Reproducción

## REACCIONES ADVERSAS:

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados): Inflamación del sitio de inyección ( $\leq 5$ mm) a veces dolorosa, estornudos, tos, descarga nasal, apatía, disminución del apetito. Estos signos pueden permanecer 1-2 días.

Frecuentes (1 a 10 animales por cada 100 animales tratados): Fiebre durante 1-2 días.

Muy raros (<1 animal por cada 10 000 animales tratados, incluidos informes aislados): Dolor en el punto de inyección, pérdida de pelo en el punto de inyección, prurito en el punto de inyección. Reacciones de hipersensibilidad (p. ej., prurito, disnea, vómito, diarrea y colapso, incluyendo anafilaxia). Reacciones del síndrome de cojera febril en gatitos.

## ADVERTENCIAS:

Vacunar únicamente animales sanos.

Los anticuerpos maternos, que pueden persistir hasta las 9-12 semanas de edad, pueden tener una influencia negativa sobre la eficacia de la vacunación. En presencia de anticuerpos maternos, puede que la vacunación no evite completamente los signos clínicos, la leucopenia y la excreción del virus tras una infección con FPLV. En aquellos casos en los que cabe esperar un nivel alto de anticuerpos maternos, el programa de vacunación debe ser planificado en consecuencia.

## PRECAUCIONES ESPECIALES:

**Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:**

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

**Gestación, lactancia y fertilidad:**

No utilizar durante la gestación y lactancia, puesto que el medicamento veterinario no ha sido investigado en gatas gestantes o en lactación. El virus FPL vivo puede producir problemas reproductivos en gatas gestantes y defectos de nacimiento en la progenie

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del uso concurrente de esta vacuna con cualquier otra. No se recomienda la administración de otras vacunas antes y después de la vacunación con Nobivac® Tricat Trio

**Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):**

A una sobredosis de 10 veces, se puede observar una ligera inflamación dolorosa en el punto de inyección durante 4-10 días. Puede aparecer un aumento de temperatura corporal leve y pasajero (hasta 40,8 °C) durante 1-2 días. En algunos casos se puede observar malestar, tos, estornudos, letargia temporal y disminución del apetito durante unos pocos días después de la vacunación.

**Incompatibilidades:**

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario

**Precauciones de Almacenamiento:**

Conservar en refrigeración de 2 y 8°C, protegido de la luz.

No congelar.

Nobivac® diluyente, puede conservarse a temperatura ambiente (<25°C).

**PRESENTACIONES:**

Caja con 25 frascos de una dosis.

**PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivados de dichos medicamentos veterinarios deben eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



[farmacovet@merck.com](mailto:farmacovet@merck.com)

**ELABORADO POR:**

**Intervet International B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**Intervet México**

Av. San Jerónimo 369, Colonia



5830 AA, Boxmeer,  
Netherlands.

La otra Banda, Álvaro Obregón,  
C.P. 01090, Ciudad de México.  
[www.msd-salud-animal.com.mx](http://www.msd-salud-animal.com.mx)

