

FICHA TÉCNICA

PORCILIS[®] ERY

Reg. B-0273-090

USO VETERINARIO

1

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ERISPELA EN LOS CERDOS CAUSADA POR *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Antígeno inactivado de <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> (cepa M2, serotipo 2)	200 mg (\geq 1 PPD*)
Acetato de dl- α -tocoferol	150 mg
Vehículo c.b.p.	2 ml

*Dosis Protectora de cerdo

DESCRIPCIÓN:

Porcilis[®] ERY es una vacuna inactivada que contiene 200 mg (\geq 1 PPD) de antígeno de *Erysipelothrix rhusiopathiae* (cepa M2, serotipo 2), por dosis en adyuvante acuoso.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cerdos, como ayuda en el control de la erisipela porcina.

ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular profunda en el cuello detrás de la oreja.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Los cerdos deben ser vacunados a partir de las 10 semanas de edad. La vacunación se repite después de 4 semanas.

La vacuna de refuerzo se administra a verracos y cerdas durante el periodo de lactancia dos veces al año.

Vacunar a los verracos y cerdas jóvenes 2 semanas antes del apareamiento.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25°C).
- Agite bien antes de usar y durante la vacunación.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede presentarse un ligero aumento de la temperatura corporal, una inflamación leve y cierta renuencia a moverse. Todas estas reacciones son transitorias.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se presentan síntomas particulares con una dosis doble.

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8 °C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

Utilice el producto durante las 10 primeras horas después de abierto el envase.

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Caja con frascos de 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet Inc.

29160 Intervet Lane,
P.O. Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La Otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.