

FICHA TÉCNICA

PORCILIS® MYCO SILENCER® ONCE

Reg. SAGARPA B-0273-175

USO VETERINARIO

1

BACTERINA PARA LA PREVENCIÓN DE NEUMONÍA EN LECHONES

FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Cultivos inactivos de *Mycoplasma hyopneumoniae* cepa 11 1 RP*

Vehículo c.b.p. 2 ml

*Potencia Relativa

DESCRIPCIÓN:

Porcilis® Myco Silencer® Once contiene cultivo inactivado de *Mycoplasma hyopneumoniae* en el adyuvante patentado Microsol Diluvac Forte®.

INDICACIONES:

Para la inmunización de lechones sanos como auxiliar en la prevención de la neumonía causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

ESPECIES DESTINO:

Cerdos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml o 2 ml por vía intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Administre una sola dosis de 2 ml a lechones sanos a partir de las tres semanas de edad o alternativamente administrar una dosis de 1 ml a partir de la tercera semana de edad seguida de una segunda dosis de 1 ml entre 2 y 3 semanas después de la primera aplicación. La vacunación con una dosis protege hasta 6 meses.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agite bien antes de usar.
- Evite su contaminación.
- Utilizar inmediatamente después de su reconstitución e ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Reacciones locales en el sitio de aplicación son frecuentes, pero se limitan a una ligera hinchazón (< 2cm de diámetro), que desaparece dentro de las 24 a 48 horas después de la inyección. En caso de reacciones de hipersensibilidad (choque), el tratamiento adecuado será la administración de epinefrina.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No aplica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No existe diferencia alguna con la administración de una dosis única (ver reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No se reconocen incompatibilidades.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 7°C.
No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

PERIODO DE RETIRO:

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

PRESENTACIONES:

Frascos con 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet Inc.
29160 Intervet Lane,
P.O Box 318, Millsboro,
Delaware 19966, USA.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.