

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® PUPPY DP PLUS

Reg. SAGARPA B-0273-300

USO VETERINARIO

**BIOLÓGICO PARA LA INMUNIZACIÓN DE CACHORROS
PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES POR EL
VIRUS DEL DISTEMPER CANINO Y PARVOVIRUS CANINO**



1

FÓRMULA:

Cada dosis (1 mL) de vacuna reconstituida contiene:

Virus vivo de Distemper canino, cepa Onderstepoort:

$\geq 10^{5.1}$ TCID₅₀*

Parvovirus canino vivo cepa 630a:

$\geq 10^{5.1}$ TCID₅₀*

*Dosis infecciosa de cultivo tisular 50%

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® Puppy DP PLUS es una vacuna viva liofilizada que contiene la cepa Onderstepoort del virus de Distemper canino (CDV) y la cepa 630a del Parvovirus canino (CPV). La vacuna es segura para su uso en cachorros a partir de las 4 semanas de edad, y la duración de la inmunidad es de 8 semanas después de una sola vacuna. Esta duración de la inmunidad es suficiente para proteger a los cachorros susceptibles contra Distemper canino y Parvovirus canino hasta que se administren las vacunas principales.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad para prevenir los signos clínicos y la mortalidad de la infección por el virus de Distemper (moquillo) canino y la infección por Parvovirus canino y para prevenir la excreción viral después de la infección por el virus de Distemper canino y después de la infección por Parvovirus canino.

Inicio de la inmunidad: Virus del Distemper canino: 7 días

Parvovirus canino: 3 días.

Duración de la inmunidad: 8 semanas.

ESPECIES DESTINO:

Perros (cachorros)



FORMA FARMACÉUTICA:

Liofilizado: Pastilla de color blanco o crema

Diluyente: solución incolora transparente

2

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicación subcutánea



Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea en cachorros a partir de las 4 semanas de edad.

Reconstituir una dosis de un solo vial que contiene liofilizado con el diluyente incluido.

Administrar todo el contenido del vial.

Producto reconstituido: suspensión de color rosada o rosa.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Con Nobivac® Puppy DP Plus la inmunidad contra el Parvovirus canino se logra en animales de 4 semanas de edad con niveles de anticuerpos maternos en el rango más elevado normalmente presentes a esta edad.

Con Nobivac® Puppy DP Plus la inmunidad contra el virus de Distemper canino se logra en animales de 4 semanas de edad con niveles bajos a moderados de anticuerpos maternos.

La duración de la inmunidad es de 8 semanas después de una sola vacuna.

La aplicación de Nobivac® Puppy DP Plus se recomienda a partir de las 4 semanas de edad como parte de un programa de vacunación amplio que incluya la aplicación de Nobivac® DHPPi o Nobivac® DH Parvo C en repetidas dosis hasta por lo menos las 12 semanas de edad.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

Hay que asegurar que el liofilizado esté completamente reconstituido antes de usarse.

Antes de la administración, la vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente (15-25°C).

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

REACCIONES ADVERSAS:

Muy frecuentes (>1 animal por cada 10 animales tratados): Inflamación del punto de inyección no dolorosa (≤ 1 cm de diámetro) durante la primera semana después de la vacunación. La inflamación remitirá completamente en unos pocos días.

Raros (1 a 10 animales por cada 10,000 animales tratados): Letargia en las 4 horas siguientes a la vacunación.

Muy raros (<1 animal por cada 10,000 animales tratados, incluidos informes aislados): Reacción de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia (a veces mortal). Si se produce tal reacción, debe administrarse sin demora un tratamiento adecuado.

ADVERTENCIAS:

Vacunar únicamente animales sanos

Niveles moderados a altos de anticuerpos maternos contra el virus de Distemper canino pueden reducir la eficacia del producto contra el Distemper canino.

En algunos cachorros se puede encontrar la cepa de la vacuna de parvovirus canino en las heces hasta 8 días después de la inoculación. En ocasiones el virus puede propagarse a otros perros, pero sin causar signos clínicos de la enfermedad. Los cachorros vacunados no propagan el virus de Distemper canino.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el prospecto o la etiqueta.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Existe información sobre la seguridad que demuestra que esta vacuna se puede administrar en el mismo día, pero no mezclada, con la vacuna de la gama Nobivac® que contiene los componentes *Bordetella bronchiseptica* y virus de Parainfluenza canina para administración intranasal. La eficacia después del uso concurrente no ha sido investigada. Por tanto, aunque se ha demostrado la seguridad del uso concurrente, el veterinario debe tener esto en cuenta cuando decida administrar los medicamentos al mismo tiempo.

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario excepto el medicamento mencionado anteriormente. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No se han observado acontecimientos adversos diferentes a los mencionados en reacciones adversas tras la administración de una sobredosis de 10 veces de la vacuna.

Incompatibilidades:

No mezcle con ningún otro producto veterinario, con excepción del diluyente incluido para usarse con el medicamento veterinario y los medicamentos veterinarios mencionados anteriormente

Precauciones de Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños

Liofilizado: Almacenar en refrigeración (2°C - 8°C). No congelar. Proteger de la luz.

Diluyente: Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de almacenamiento. No congelar.

No utilizar el medicamento veterinario después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Vida útil una vez reconstituido de acuerdo con las instrucciones: 30 minutos

PRESENTACIONES:

Caja de plástico con 5 viales de una dosis y 5 viales que contienen 1 ml de solvente.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Todo producto veterinario no utilizado o los materiales de desecho derivado de dicho producto debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales.

4

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

EN CASO DE REACCIÓN ADVERSA, REPÓRTALO AL CORREO:



farmacovet@merck.com

ELABORADO POR:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer, Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.

www.msd-salud-animal.com.mx